

ЛЕНАЛИДОМИД

Информация для пациентов

Женщины, неспособные к деторождению



Краткое описание

- Леналидомид может быть опасен для плода.
 - Было доказано, что леналидомид вызывает врожденные пороки развития у животных и может обладать аналогичным действием у человека.
 - Чтобы исключить воздействие ленилидомида на плод, ваш врач заполнит «Форму для начала лечения», указав, что вы НЕ способны к деторождению.
 - Вы не должны передавать леналидомид другим лицам.
 - Следует всегда передавать неиспользованные капсулы провизору как можно раньше для дальнейшего безопасного уничтожения.
- Если во время приема леналидомида у вас возникли какие-либо побочные эффекты, следует сообщить об этом своему врачу.
 - Вы не должны быть донором крови во время лечения, при прерывании приема препарата и в течение не менее 7 дней после прекращения лечения.
 - Дополнительная информация приведена в инструкции по медицинскому применению.

Побочные эффекты

- Как и любой препарат, леналидомид может вызывать побочные эффекты, хотя и не у всех пациентов.
- Некоторые побочные эффекты встречаются чаще, чем другие, и отдельные из них являются более серьезными, чем остальные.
- Если вам необходима более подробная информация, проконсультируйтесь со своим врачом и прочтите инструкцию по медицинскому применению.
- Почти все побочные эффекты являются временными. Их можно легко предотвратить или вылечить.
- Самое важное — знать, чего можно ожидать и о чем нужно сообщить врачу.
- Очень важно, чтобы вы сообщали своему врачу о любых побочных эффектах, которые возникли во время лечения леналидомидом.


Информация, которую следует учитывать при использовании леналидомида пациентам, членам их семей и лицам, осуществляющим уход за пациентами

Храните блистеры с капсулами в оригинальной упаковке.

Капсулы иногда могут быть случайно повреждены при выдавливании из блистера, особенно если надавливать на середину капсулы. Капсулу не следует извлекать из блистера, надавливая на середину или оба

конца, так как это может привести к разрушению капсулы.

Рекомендуется надавливать только на один конец капсулы (см. рисунок ниже), в этом случае воздействие оказывается только на один участок, что уменьшает риск ее разрушения.



При применении леналидомида соблюдайте указанные ниже меры предосторожности, чтобы защитить себя от случайного действия препарата, если вы являетесь членом семьи или лицом, осуществляющим уход за пациентом

- Надевайте одноразовые перчатки при контакте с препаратом и/или упаковкой (например, блистером или капсулой).
- Правильно снимайте перчатки для предотвращения возможного действия на кожу (см. далее).
- Поместите перчатки в заклеивающийся полиэтиленовый пакет и утилизируйте в соответствии с местными требованиями.
- После удаления перчаток тщательно вымойте руки водой с мылом.

Если упаковка препарата выглядит поврежденной, используйте следующие дополнительные меры предосторожности, чтобы защитить себя от случайного воздействия препарата

- Если вы видите, что упаковка повреждена, **не открывайте ее.**
- Если блистеры повреждены или содержимое высыпается, **немедленно закройте картонную упаковку** и:
 - Поместите упаковку в герметично закрывающийся полиэтиленовый пакет;
 - Как можно быстрее верните неиспользованную упаковку провизору для безопасной утилизации.

Если содержимое капсулы просыпалось, примите надлежащие меры предосторожности, чтобы свести к минимуму его воздействие, с помощью соответствующих средств индивидуальной защиты

- Если капсулы повреждены, пыль, содержащая действующее вещество, может попасть в окружающую среду. Постарайтесь не рассыпать содержимое капсулы и не вдохнуть его.
 - Для уборки просыпавшегося порошка наденьте одноразовые перчатки.
 - Положите влажную ткань или полотенце на поверхность, где просыпался порошок, чтобы свести к минимуму попадание его в воздух. Добавьте больше жидкости, чтобы вещество могло полностью раствориться. Затем тщательно
- вымойте поверхность водой с мылом и высушите.
- Поместите все материалы, контактировавшие с порошком, включая влажную ткань или полотенце, а также перчатки в заклеивающийся полиэтиленовый пакет и утилизируйте в соответствии с местными требованиями для лекарственных средств.
 - После снятия перчаток тщательно вымойте руки водой с мылом.
 - Немедленно сообщите о случившемся вашему врачу.

Если содержимое капсулы попало на кожу или слизистые оболочки

- Если порошок попал на кожу, тщательно промойте пораженную область водой с мылом.
 - Если порошок попал в глаза, в вы
- носите контактные линзы, снимите их и утилизируйте. Промойте глаза проточной водой не менее 15 минут. Если возникло раздражение, обратитесь к офтальмологу.

Правильная техника снятия перчаток

- Возьмитесь за край перчатки около запястия (1);
- Стяните перчатку с руки, выворачивая ее наизнанку (2);
- Держите перчатку в руке с надетой перчаткой (3);
- Просуньте пальцы без перчатки под манжету оставшейся перчатки, будьте осторожны, чтобы не касаться внешней стороны перчатки (4);
- Стяните с руки перчатку, выворачивая ее наизнанку, создавая «мешочек» для обеих перчаток;
- Утилизируйте в соответствующий контейнер;
- Тщательно вымойте руки водой с мылом.

