

Важная информация

ФИО пациента:

Я принимаю Аровабан® (ривароксабан) в дозе:

20 мг

15 мг

(отметьте галочкой ту дозу препарата, которую Вы принимаете в настоящий момент)

Другие лекарственные препараты:

ФИО лечащего врача:

Название учреждения, телефон:

Как принимать Аровабан® (ривароксабан)?



1 таблетка 1 раз в день

ДЛИТЕЛЬНО



Принимайте регулярно и до тех пор, пока продолжает назначать лечащий врач



При пропуске приема немедленно примите Аровабан® (ривароксабан) и на следующий день продолжайте регулярный прием в соответствии с режимом. Не удваивайте дозу для компенсации пропущенной ранее.



Во время приема пищи



Можно измельчить перед приемом и смешать с водой/жидким питанием

Материал подготовлен исключительно для пациентов, принимающих ривароксабан (Аровабан®) 20 или 15 мг по рекомендации врача. Материал подготовлен в рамках мер по минимизации рисков и не является рекламным материалом.



Что нужно знать о препарате Аровабан® (ривароксабан)?

- Аровабан® - антикоагулянт, который блокирует образование тромбов. Назначение и длительность терапии определяется лечащим врачом.
- Не прекращайте прием Аровабана® без обсуждения с лечащим врачом, поскольку этот препарат **предотвращает развитие серьезных осложнений (инсульта и системной тромбоэмболии)**.
- **Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете другие антикоагулянты**, например, нефракционированный гепарин, низкомолекулярный гепарин (эноксапарин, далтепарин), фондапаринукс, варфарин, дабигатран, аписабан и другие, кроме случаев перехода с или на ривароксабан или применения нефракционированного гепарина в дозах, необходимых для обеспечения функционирования центрального венозного или артериального катетера.
- **Перед любыми хирургическими вмешательствами или инвазивными процедурами информируйте медицинский персонал о том, что вы принимаете Аровабан®.**



Когда следует обратиться к врачу?

Принимая антикоагулянты, такие как Аровабан®, необходимо быть в курсе возможных побочных эффектов:

Кровотечение:

- Внутрочерепное кровотечение/кровоизлияние с симптомами: головная боль, слабость одной стороны тела, тошнота, рвота, уменьшение ясности сознания, скованность затылочных мышц. Это состояние опасно для жизни, срочно требуется медицинская помощь.
- Длительное или сильное кровотечение.
- Необычная слабость, усталость, бледность, головокружение, головная боль, необъяснимые отеки, одышка, боль в груди или стенокардия.

Тяжелая кожная реакция (сыпь, волдыри, отек).

Тяжелая аллергическая реакция (отек лица, губ, рта, языка или горла, затрудненное глотание и дыхание, резкое снижение давления).

Вы также можете сообщить о побочных эффектах (нежелательных реакциях), развившихся при применении препарата Аровабан® производства компании ООО «Изварино Фарма»

Адрес: 108817, г. Москва, км Внуковское шоссе 5-й (п. Внуковское), двл. 1, стр. 1

Телефон: +7 (495) 232-56-55

Электронная почта: info@izvarino-pharma.ru