

**Карточка-памятка для пациентов, принимающих  
ЛП Транидаб<sup>®</sup>, капсулы, 75 мг, 110 мг, 150 мг**

**Храните эту памятку при себе и показывайте ее любому специалисту системы здравоохранения, участвующему в вашем лечении**

- **Регулярно принимайте** лекарственный препарат (ЛП) **Транидаб<sup>®</sup>**, в соответствии с листком-вкладышем.  
В случае пропуска приема примите препарат как можно скорее, а в дальнейшем продолжите прием 2 раза в сутки в соответствии с исходной схемой. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.
- После начала терапии **не изменяйте и не прекращайте терапию** без консультации с лечащим врачом.
- ЛП **Транидаб<sup>®</sup>** является антикоагулянтом - лекарственным препаратом, воздействие которого на организм снижает свертываемость крови и предотвращает образование кровяных сгустков (тромбов). Однако это может увеличить риск кровотечения.
- Признаки и симптомы кровотечения включают синяки или кровотечения под кожей, стул цвета смолы, кровь в моче, кровотечение из носа, головокружение, усталость, бледность или слабость, внезапную сильную головную боль, кашель с кровью или рвоту с кровью.
- Если кровотечение не останавливается само по себе, **немедленно обратитесь за медицинской помощью!**
- Если Вам необходима операция или какая-либо инвазивная процедура, сообщите медицинскому работнику, что **Вы принимаете ЛП Транидаб<sup>®</sup>**