

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО  
ПРЕПАРАТА

**ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО**  
суппозитории ректальные 500 мг

*Oleum Hippophaes*

**Регистрационный номер: П N014882/01**

**Торговое название препарата: ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО**

**Международное непатентованное название: -**

**Лекарственная форма: Суппозитории ректальные.**

**Описание**

Суппозитории торпедообразной формы от светло-желтого до темно-оранжевого цвета; на срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

**Состав**

Один суппозиторий содержит:

**активный компонент:** облепиховое масло (концентрат облепихового масла с содержанием суммы каротиноидов в пересчете на  $\beta$ -каротин не менее 240 мг %) - 500 мг;

**вспомогательные вещества:** бутилгидроксианизол 0,5 мг, бутилгидрокситолуол 0,5 мг, кремния диоксид коллоидный безводный 80 мг, полусинтетические глицериды (Суппоцир ВМ) - достаточное количество для получения суппозитория массой 2000 мг.

**Фармакотерапевтическая группа**

Препараты для лечения геморроя для местного применения.

**Код АТХ: С05АХ.**

**Фармакологические свойства:**

Масло облепиховое – смесь каротина и каротиноидов, суммы токоферолов, хлорофилловых соединений, глицеридов олеиновой, леноленовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Комплекс биологически активных веществ стимулирует репаративные процессы при поражении слизистой оболочки прямой кишки различной этиологии. Установлено, что все три формы витамина А (ретинол, ретиналь и ретиновая кислота) повышает количество митозов в эпителиальных клетках и препятствует накоплению кератогиалина в них. Ретинолы и его производные стимулируют эпителизацию и предотвращают избыточное ороговение эпителия. Доказано, что витамин А является естественной составной частью эпителиальных клеток, способствующая синтезу РНК и сульфатированных мукополисахаридов, играющих важную роль в проницаемости клеточных и субклеточных мембран.

**Показания к применению**

Геморрой, трещины заднего прохода, эрозивно-язвенные поражения прямой кишки, проктит, лучевое поражение слизистой оболочки нижних отделов толстой кишки.

**Способ применения и дозы**

Ректально. Суппозитории освобождают от контурной упаковки, предварительно разрезав пленку по контуру суппозитория при помощи ножниц и вводят глубоко в задний проход после опорожнения кишечника. Взрослым и детям старше 14 лет назначают по 500 мг 2 раза в день. Детям до 6 лет - 500 мг 1 раз в день; 6-14 лет - 500 мг 1-2 раза в день. Средняя продолжительность курса лечения составляет 10-15 дней.

При необходимости через 4-6 недель курс лечения повторяют.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, ощущение жжения в прямой кишке, диарея. Болезненность при длительном применении.

### **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость к компонентам препарата.

**Беременность и лактация:** нет ограничений к применению во время беременности и лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не описаны.

### **Передозировка**

Не описаны случаи передозировки.

### **Особые указания**

Лица с повышенной чувствительностью применяют с осторожностью.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению потенциально опасными механизмами:* Применение препарата не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению потенциально опасными механизмами.

### **Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 500 мг.

По 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из ПВХ/ПЭ пленки.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в

### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года.

Не использовать препарат по истечении срока, указанного на упаковке.

**Условия отпуска:** отпускают без рецепта.

**Предприятие-производитель:**

ООО «ФАРМАПРИМ», адрес:

Республика Молдова, MD-4829,

ул. Кринилор, 5, с. Порумбень, р-он Криулень,

Тел.: (+373-22)-28-18-45,

тел/факс: (+373-22)-28-18-46.

7(495)502-48-72,

[www.farmaprim.md](http://www.farmaprim.md)