

**Памятка для пациента,
принимающего лекарственный препарат (ЛП)
Ацинатиб[®], таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг**

Перед применением ЛП Ацинатиб[®], таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг, пожалуйста, ознакомьтесь с листком-вкладышем, находящимся в пачке с ЛП, либо на сайте Государственного реестра лекарственных средств для получения дополнительной информации.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с врачом или другим медицинским работником.

- Данный лекарственный препарат относится к группе иммунодепрессантов (средств, угнетающих иммунитет)
- Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача, не превышая рекомендуемую дозу.
- Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропуск приема пропущенной таблетки. Примите следующую таблетку в обычное время и продолжайте лечение, как и прежде.
- Сообщите своему лечащему врачу обо всех препаратах, которые Вы принимаете, недавно принимали или планируете начать принимать, в том числе о рецептурных и безрецептурных препаратах, витаминах и растительных добавках.

Сообщайте врачу **обо всех нежелательных реакциях**, возникающих на фоне приема лекарственного препарата Ацинатиб[®], таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг.

Немедленно сообщите врачу, если у Вас возникнут какие-либо из следующих признаков и симптомов при приеме лекарственного препарата:

- Повышение температуры тела, озноб, потливость, усталость, длительный кашель, одышка, появление мокроты или изменение количества, или цвета мокроты, боль в мышцах, теплая на ощупь кожа или покраснение, или болезненность кожи, или появление волдырей на теле, потеря веса, трудности или боль при глотании, диарея или боль в желудке, болезненное или учащенное мочеиспускание могут быть **признаками серьезных инфекций (включая сепсис, оппортунистические инфекции)**;
- Лихорадка, боль в желудке или в животе, кровь в стуле, необъяснимые изменения характера и частоты стула могут быть признаками **язв или отверстий (перфорации) в стенках желудка**;
- Внезапная одышка или затрудненное дыхание, боль в грудной клетке или верхней части спины, отек рук или ног, боль или болезненные ощущения в ногах, покраснение или изменения цвета кожи на руках или ногах, острые изменения зрения, могут быть **признаками венозной тромбоэмболии**;
- Сильная боль или чувство давления в грудной клетке (которые могут распространяться в руки, челюсть, шею и спину), одышка, холодный пот, чувство дурноты или внезапное головокружение **признаками инфаркта миокарда**;
- Любое новообразование на коже или любые изменения в существующих родинках или пятнах;
- Симптомы заболевания легких, такие как одышка;
- Пожелтение кожи, тошнота и рвота (**признаки поражения печени**).

Также сообщите врачу:

- Если Вы болеете в настоящее время или болели в прошлом **туберкулезом**, или Вы вступали в тесный контакт с больными туберкулезом.
- Если Вам недавно сделали **прививку** или она запланирована на ближайшее время;
- Если Вы **беременны или кормите грудью**, думаете, что забеременели, или планируете беременность. Прием ЛП Ацинатиб[®], таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг, противопоказан в период беременности. Женщинам детородного возраста следует использовать эффективные методы контрацепции во время лечения ЛП Ацинатиб[®], таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг, и в течение как минимум 4 недель после приема последней дозы препарата.

Контактная информация (пожалуйста, заполните):

ФИО пациента: _____

ФИО врача: _____

Телефон врача: _____

В случае возникновения нежелательной реакции Вы также можете обратиться в компанию ООО «Изварино Фарма» по по эл. адресу: info@izvarino-pharma.ru

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного препарата.

После прекращения лечения ЛП Ацинатиб[®], таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг, Вы должны хранить эту памятку при себе в течение как минимум 2-х месяцев после приема последней дозы.

Дата прекращения приема препарата: _____